

L-Mesitran® Soft Wundgel

Zusammensetzung

L-Mesitran Soft ist ein Wundgel der die folgenden Bestandteile enthält: medizinischer Honig, medizinisches hypoallergenes Lanolin (Medilan®), Propylen Glycol, PEG 4000 und Vitamine C & E. Wenn das Wundgel in Kontakt mit der Wunde kommt, wird durch Osmose Flüssigkeit aus dem umgebenden Gewebe gezogen. L-Mesitran Wundgel schafft ideale Bedingungen für eine feuchte Wundheilung. Autolyse und Epithelisierung werden unterstützt. Der Heilungsprozess wird so gefördert.

- Aufgrund der starken osmotischen Aktivität hat L-Mesitran Wundgel antimikrobielle Eigenschaften.
- Das Wundgel wird sich allmählich verdünnen und kann leicht entfernt werden nach lokaler Wundreinigung.
- L-Mesitran Soft Wundgel ist eine primäre Wundauflage, das von den meisten gängigen sekundären Dressings abgedeckt werden kann.
- Die Eigenschaften des Wundgels helfen auch zu verhindern, daß der Sekundärverband sich am Wundherd verklebt.
- Durch die Verwendung von natürlichen Inhaltsstoffen, kann jede Charge des Wundgels in Farbe (weiß - gelb - braun) variieren.
- Das Wundgel kann Zuckerkrystalle enthalten, jedoch wird die Wirksamkeit oder die Anwendung dadurch nicht beeinträchtigt

Anwendungsgebiete

Chronische Wunden, Dekubitus (Phase I-IV), Venöse Stauungs-Geschwüre. Vegetierende Wunden (für Geruchs beseitigung und / oder Debridement). Kolonisierte akute Wunden, Operationswunden, Postoperative Wunden, Traumatische Wunden (oberflächliche Wunden, Schnitte). Kleine Verbrennungen; auch durch Laserbehandlung (Grade 1 und 2).

Unerwünschte Wirkungen

Verwenden Sie das Wundgel nicht bei Patienten, bei denen bekannt ist, daß sie überempfindlich sind für einen der Inhaltsstoffe. Keine andere unerwünschte Wirkungen sind bisher bekannt.

Vorsorgemassnahmen und Anmerkungen

1. Verwenden Sie keine beschädigten oder angebrochene Tuben
2. Falls behandlungsunterstützende Maßnahmen notwendig erscheinen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
3. Prüfen und reinigen Sie die Wunde nach den anwendbaren Protokollen vor dem Gebrauch.
4. Auf Grund der autolytischen Reinigung kann die Wunde nach den ersten Verbandwechseln größer erscheinen. Das ist normal und kommt, sobald das abgestorbene Gewebe entfernt wurde, als Vorbereitung des Wundherdes für die Heilung.
5. Bakterielle Besiedlung ist bei chronischen Wunden normal und ist keine Kontraindikation für die Anwendung von L-Mesitran.
6. Begeben Sie sich in ärztliche Behandlung, wenn Zeichen einer Infektion auftreten, wie Schmerzen, Fieber, Rötung oder Eiterfluss
7. L-Mesitran darf nur bei einem Patienten angewendet werden. Eine Tube kann jedoch bei demselben Patienten wieder verwendet werden
8. Schließen Sie immer die Tube nach Gebrauch wieder.
9. Bei geöffneter Verpackung und Verwendung nach Verpackungsbeilage ist das Produkt bis zum auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Tube wurde geöffnet am:/...../20

Anwendung

Zu öffnen:

1. Entfernen Sie den Schraubverschluss; reinigen Sie das Tubengewinde und die Spitze des Schraubverschlusses möglichst mit einem Alkoholtupfer.
2. Bei der 1. Verwendung einer Tube, ist es notwendig die Versiegelung der Tube durchzustechen mit der Spitze im Schraubverschluss. Vermeiden Sie das Drücken der Tube zu diesem Zeitpunkt.

Anwendung auf die Wunde:

1. Halten Sie die Düse klar oberhalb der Wundfläche, drücken Sie leicht auf die Tube, bis eine ausreichende Schicht des Wundgels auf den gesamten Wundbereich erscheint (einschließlich der peripheren Wundfläche).
2. Falls nötig, verwenden Sie zum Verteilen vom Wundgel einen (sterilen) Spatel.
3. Bedecken Sie die Wunde mit einem geeigneten Verband.
4. Erneuern Sie das Wundgel sobald das Wundgel auf der Wunde verschwunden ist. Dies ist abhängig von der Menge der Wundsekretion

Lagerung

Lagerung bei Raumtemperatur 5°-25°C / 41°-77°F. L-Mesitran Soft ist ein Naturprodukt und kann bei Temperaturunterschieden flüssiger werden. Sollte dies unerwünscht sein, können Sie die Tube ggf. vor Gebrauch in den Kühlschrank legen.